

# Melayu berisiko tinggi hadapi penyakit jantung

## SERANGAN JANTUNG

### Tempoh 10 minit pertama genting

MEREKA yang diserang penyakit jantung secara tiba-tiba boleh diselamatkan dalam tempoh 10 minit dari orang yang paling hampir dengan mereka boleh menyalamkannya dengan memberikan pemuliharaan fungsi jantung atau resusitasi kardiopulmonari (CPR) atau defibrilator luar automatik (AED).

Tempoh 10 minit itu sangat berharga jika CPR, AED atau defibrilator luar automatik digunakan. Sebaliknya, sebarang kelewatan dalam memberi bantuan boleh mengakibatkan kematian mengemut.

Namun, ramai warga Singapura belum terlatih untuk memberi bantuan CPR dan ramai yang mengabaikan bantuan ambulans, kata Konsultan Kanan, Jabatan Keselamatan dan Kecemasan (A&E), Hospital Besar Singapura (SGH), Dr Fatimah Lateef.

"Jika tidak sebarang bantuan diberi dalam tempoh ini, selud tidak akan mada mati dan jika ia berterusan hingga 10 minit, mangsa akan memasuki fasa kematian biologi yang bererti kekal."

Penduduk Singapura tinggi di flat tinggi dan ini mengambil masa untuk membawa pesakit ke hospital. Untuk mengambil lif sahaja akan memakan masa beberapa minit dan perjalanan ke hospital juga mengambil masa.

Oleh itu, CPR adalah usaha terdekat untuk menyelamatkan nyawa.

— Dr Fatimah Lateef, Konsultan Kanan, Jabatan A&E, SGH

Memurut beliau, individu yang rebah akibat serangan jantung memerlukan awakan kecemasan dalam tempoh 10 minit kerana denyutan jantung akan mati jika tidak sebarang resusitasi diberi dalam tempoh itu.

"Jika lebih dari 10 minit, peluang menyelamatkan semula agak tipis dan risiko pesakit mati secara mengemut tinggi."

Malah jika bantuan CPR diberi hanya selepas empat atau enam minit, mangsa mungkin boleh hidup tetapi otaknya rosak atau tidak berfungsi.

Kemajuan jantung mengemut (SCD) adalah serangan jantung biasanya berlaku di luar hospital, seperti di rumah, pejabat atau tempat awam.

Langkah terbaik bagi membantu pesakit yang mengalami serangan jantung ialah memberikan CPR dan menggunakan AED oleh orang yang terlatih dalam alat itu atau alat kejat jantung automatik.

Serangan jantung berlaku akibat bekalan darah arteri koronari terputus secara tiba-tiba. Kejadian ini berlaku apabila salah satu arteri tersebut tersumbat disebabkan gumpalan darah.

Gumpalan darah ini pula terjadi akibat pecahnya plak aterosklerotik dalam salah satu arteri koronari itu. Sekiranya gumpalan darah ini tidak disingkirkan dengan segera, otot jantung akan mati.

Namun ia masih boleh dirawat dengan memberi kejutan elektrik yang dikenali sebagai defibrilasi.

"Masalah ini sedikit sebanyak dapat diatasi jika mangsa mempunyai ahli keluarga yang mempelajari teknik CPR. Selain itu alat AED perlu terletak di tempat-tempat awam bagi memudahkan ia digunakan apabila berlaku kes kecemasan."

"Tenter, namu atau ahli keluarga pesakit jantung digalakkan mempelajari teknik CPR," kata Dr Fatimah.

Alat AED berharga sekitar \$2,500. Semua ambulans Puncak Perumahan Awam Singapura (SCDP) di negara ini dilengkapi alat AED.

Memurut Dr Fatimah lagi, doktor sedaya upaya memastikan mangsa serangan jantung dibawa ke hospital walaupun kadar kejayaan agak rendah.



USAHA MENYELAMAT. Dr Fatimah menunjukkan cara menjalankan CPR bagi menyelamatkan mangsa yang menghadapi serangan jantung. — Foto M.D. SALLEH

### Fatimah: Wanita dan lelaki Melayu gemuk kurang usaha kurangkan berat badan

Oleh NIZAM ISMAIL  
nizam@myk.com.sg

MASYARAKAT Melayu diletak dalam golongan berisiko tinggi menghadapi penyakit berkaitan jantung.

Komuniti Kanan, Jabatan Keselamatan dan Kecemasan (A&E), Hospital Besar Singapura (SGH), Dr Fatimah Lateef, berkata risiko itu tinggi kerana orang Melayu mempunyai penyakit-penyakit lain yang sering dikaitkan dengan masalah jantung.

Menurutnya, statistik menunjukkan orang Melayu paling ramai mengahap rokok dan menghadapi masalah kolestrol tinggi. Kencing manis, darah tinggi serta kegemukan yang dikaitkan dengan masalah jantung.

"Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Antara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.


Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

USAHA MENYELAMAT. Dr Fatimah menunjukkan cara menjalankan CPR bagi menyelamatkan mangsa yang menghadapi serangan jantung. — Foto M.D. SALLEH



"Walaupun darah tinggi menunjukkan peratusan tinggi di kalangan orang Cina, peratusan masyarakat Melayu masih terlah tinggi jika diambili kira jumlah kesihatan penduduk Melayu.

"Darah tinggi yang tidak dirawat akan menjadi masalah besar dan boleh menyebabkan keresakan arteri jantung, buah pinggang dan organ lain," ujar Dr Fatimah.

Memurut beliau lagi, lelaki Melayu gemuk tidak menunjukkan tanda-tanda hendak menamatkan berat badan.

"Saya hanya lihat sedikit kemajuan di kalangan wanita Melayu, dengan kadar kegemukan mereka mulai menurun. Kadar kegemukan wanita Melayu stabil kerana ada keawakan di kalangan mereka untuk menyertai senaman aerobik dan pelbagai lagi."

"Tetapi lelaki Melayu masih tidak menunjukkan sebarang perubahan nyata," kata Dr Fatimah.

Beliau berkata orang Melayu tidak seharusnya tewas hati untuk bersemen ekorin bertukar kemahiran beberapa individu sahut yang rebah akibat serangan jantung semasa melakukan senaman (SCD) baru-baru ini.

SCD sejenis kematian berkaitan dengan jantung dan membentuk ancaman kemasukan sedemikian.

Memurut Kementerian Kesihatan (MOH), kejadian SCD meningkat daripada 26 bagi setiap 100,000 penduduk pada 1998 kepada 34 tahun lalu.

Kemalangan itu, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

Penyakit-penyakit ini adalah faktor yang meningkatkan risiko berlaku serangan jantung. Statistik menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai masalah kesihatan yang lebih tinggi daripada kadar nasional," kata Dr Fatimah dalam satu interviu dengan Berita Harian baru-baru ini.

Andara lain, Kajian Kesihatan Nasional (NHS) 2004 menunjukkan 19.1 peratus orang Melayu dewasa gemuk, berbanding 13.4 orang India dewasa dan 4.2 peratus orang Cina dewasa.

Berdasarkan perangkaan daripada Pejabat Pendaftaran Kalendar dan Kemahiran, penyebab utama kematian di kalangan orang Melayu dari 2000 hingga 2007 ialah sakit jantung dan darah tinggi.

## TANDA AWAL SERANGAN JANTUNG

- ▶ Tekanan tidak selesa, rasa sesak, penuh atau sakit di bahagian dada berlanjutan lebih beberapa minit atau sakit yang hilang dan datang semula.
- ▶ Sakit atau ketidakselesaan pada bahagian-bahagian lain di bahagian atas badan.
- ▶ Sakit dada di bahagian tengah atau kadangkala di sebelah kiri dada.
- ▶ Sakit merebak ke bahagian leher depan dan dagu, dan juga tangan kiri atau kanan.
- ▶ Rasa kebas di tangan kiri atau kanan ketika merasa sakit di dada.
- ▶ Berpeluh sejuk.
- ▶ Kelesakan nafas dengan atau tanpa rasa ketidakselesaan pada bahagian dada.
- ▶ Pening atau mual atau loya atau paitan.
- ▶ Ulah memandu sendiri, jika mengemut ambulans tiba, sebaik-baiknya diemam sekiranya lamunan kecemasan seperti resusitasi kardiopulmonari (CPR) perlu diberi.

▶ Jika pervaian terheni secara tiba-tiba atau sesak pinggan, kemungkinan besar pesakit mengalami serangan jantung. Pesakit berkenungkinan besar mengalami kematian mengemut jika bantuan CPR dan defibrilator luar automatik (AED) tidak diberi dengan segera